



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی تهران



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی
دکتر شریعتی

نکات قابل توجه در بیماران با ضایعات پاتولوژیک



گروه آموزش سلامت به بیمار

بیمارستان دکتر شریعتی

بخش جراحی دهان، فک و صورت (کد: ۱۹۱)


زیر نظر: آقای دکتر محمد بیات

گردآورندگان: ه. قاسمی - دکتر امیریان

دفتر حاکمیت بالینی

دفتر پرستاری

Clinical Governance



ضایعات پاتولوژیک

ضایعاتی هستند که به علت اختلال در نظم بافت سخت و نرم ایجاد می‌شوند که این ضایعات می‌توانند کیستیک یا تومورال باشند که ضایعات تومورال می‌توانند بدخیم یا خوش خیم باشند.

دهان ناحیه ای است که تغییراتش به راحتی دیده می‌شود. انجام معاینات منظم به شما در این مورد کمک می‌کند و شانس بهبودی را افزایش می‌دهد.

تحقیقات نشان داده مهمترین عاملی که در ایجاد سرطان های دهانی موثر است استفاده از الکل و تنباکو است عوامل دیگر شامل تغذیه نامناسب بهداشت نامناسب، التهاب ناشی از استفاده از دندان مصنوعی، دندانهای ناصاف و عفونتهای مزمن نیز در ایجاد سرطانهای دهانی موثرند.

نکات بعد از عمل:

از فردای روز عمل (در صورت امکان) دهانشویه کلرهگزیدین بر اساس دستورالعمل داده شده ۲ بار در روز استفاده شود.

مسواک زدن دندانها بطور مرتب پس از عمل انجام شود (حداقل ۳ بار در روز). حتی در صورت بسته بودن فک بالا و پایین بیمار به یکدیگر، مسواک زدن ضروری است.



پیشگیری:

جراحان دهان، فک و صورت پیشنهاد می‌دهند که هر فردی که در معرض ابتلا به سرطان دهان می‌باشد باید معاینات بالینی را انجام دهد. بعضی نشانه‌ها مثل لکه‌های سفید یا قرمز، زخمهای مزمن گلو، توده‌های گردنی یا دهانی، مورد نظر می‌باشند.

اگر این نشانه‌ها را دارید به جراح دهان فک و صورت مراجعه کنید ابتدا نمونه‌برداری انجام می‌شود و نمونه به آزمایشگاه مخصوص (پاتولوژی) پاتولوژی ارسال می‌شود.

جواب پاتولوژی به پزشک در درمان بهتر کمک می‌کند.

بدیهی است در صورتیکه پس از عمل جهت بیمار وسایل پروتزی مثل مسدودکننده‌ها (ابچوراتور) استفاده شده است می‌بایست مرتباً تمیز گردد.

بروز خونریزی مختصر از ناحیه زخمهای داخل دهانی طبیعی است ولی در صورت بروز خونریزی شدید و غیر قابل کنترل به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.

بعد از ترخیص داروهای تجویز شده را طبق دستور پزشک مصرف نماید.

پس از ترخیص در صورت بروز تورم، خروج چرک در ناحیه یا سایر مشکلات به درمانگاه جراحی فک و صورت مراجعه کنید.

در صورت عدم بروز مشکلات بیمار می‌بایست در تاریخ تعیین شده جهت بررسی بیشتر و خارج کردن بخیه‌های خارج دهانی به درمانگاه جراحی فک و صورت مراجعه کند.

در صورت ایجاد محدودیت در باز شدن دهان بطور منظم طبق توصیه پزشک فیزیوتراپی خود را ادامه دهید.



تهران - خیابان کارگر شمالی - سه راه جلال آل احمد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی

تلفن: ۸۸۲۲۰۰۰۰ ، ۸۴۹۰۱

www.shariatihospital.ir , info@shariatihospital.ir