



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی تهران



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی
دکتر شریعتی

تخمک اهداء



گروه آموزش سلامت به بیمار

بیمارستان دکتر شریعتی

بخش نازایی (کد ۷)

زیرنظر: خانم دکتر سروی

گردآورندگان: غ - دلیران ، ف- احمد مخبری

دفتر حاکمیت بالینی

دفتر پرستاری

Clinical Governance



تخمک اهداء

با روشهای پیشرفته در درمان ناباروری دیگر جایی برای نا امید شدن زوجهای نابارور با هر علت که باشد باقی نمی ماند . با اهداء تخمک از فرد دهنده داوطلب پنجره ای دیگر به سوی درمان ناباروری باز شد . در روش اهدای تخمک از تخمک اهدایی شخص اهداء کننده و مایع منی شوهر گیرنده برای باروری استفاده شده و سپس جنین تشکیل شده به رحم شخص گیرنده منتقل می شود .

موارد کاربرد اهداء تخمک

■ بیمارانی که تخمدان فعال ندارند .

■ تخمدان غیر حساس دارند یعنی به دارو جواب نمی دهد .

■ دچار یائسگی زودرس شده اند (تخمدان ها زیر سنین ۴۰ سالگی از کار می افتد) .

■ بیمارانی که تخمدان فعال دارند .

■ تخمک غیر طبیعی دارند .

■ اشکالات ژنتیکی دارند .

■ در درمان با لقاح خارجی و انتقال جنین دچار شکست شده اند

فرد گیرنده تخمک اهدائی

■ حداکثر ۴۵ سال سن داشته باشد .

■ مشاوره روانپزشکی شود .

■ از نظربیماریهای قلبی و عروقی کنترل گردد.

■ از نظر اعتقادات دینی هم ردیف اهداء کننده باشد .

■ از نظر مسائل قانونی ، ارث و ... طرفین صحبت نمایند تا نقاط مبهم روشن گردد .

■ انجام آزمایشات خونی و معاینات فرد گیرنده از نظر سلامت کامل جسمی و روانی بخصوص محوطه تخمدان و رحم .

شرایط اهداء کننده تخمک

■ دارای سن قانونی باشد ترجیحاً ۲۱ تا ۳۰ سال .

■ قبلاً بچه دار شده باشد تا دچار اشکالات روحی روانی نگردد .

■ از نظر ظاهر (رنگ مو ، چشم ، پوست) شبیه فرد گیرنده باشد .

■ از نظر RH خونی مشابه باشند .

■ مشکل ژنتیکی نداشته باشد .

■ دچار بیماریهای عفونی و ویروسی واگیردار نباشد .

■ در معاینات از نظر جسمی سالم باشد بخصوص (محوطه لگن ، رحم و تخمدان) .

■ از همه مهمتر دچار اختلال روانپزشکی واضح نباشد .

بررسی همسر فرد گیرنده و آماده کردن اسپرم

همسر فرد گیرنده باید مورد معاینه قرار گیرد و از وی یکسری آزمایشات خونی گرفته شود . درضمن مایع منی از همسر فرد گیرنده گرفته می شود و بررسی می گردد و حداقل یک یا چند نمونه از اسپرم شوهر فریز می گردد که اگر در زمان گرفتن تخمک ، نمونه اسپرم به طور غیر منتظره مناسب نبود مورد استفاده قرار گیرد .



نحوه انتقال و میزان موفقیت

روش انتقال به صورت انتقال داخل رحمی و یا بصورت انتقال داخل لوله ای می باشد .

در تمام مدت بارداری مراقبتهای ویژه پزشکی انجام می گردد و

مادر تحت کنترل می باشد تا مدت بارداری به اتمام برسد . البته

با افزایش این نوع باروری ، مانعی برای زایمان طبیعی نیز به چشم

نمی خورد .



تهران - خیابان کارگر شمالی - سه راه جلال آل احمد

مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی

تلفن: ۸۸۲۲۰۰۰۰ ، ۸۴۹۰۱

www.shariatihospital.ir , info@shariatihospital.ir