

## آنچه که باید درباره ی (( داروی رمدسیویر)) بدانید

### آیا از دلیل مصرف آمپول رمدسیویر برای بیماری کرونا و مدت استفاده از آن اطلاع دارید؟



مددجویان ارجمند، داروی رمدسیویر طبق نظر پزشک متخصص ریه ، متخصص بیماریهای عفونی و متخصص داخلی برای درمان بیماران مبتلا به بیماری کووید ۱۹ قابل تجویز است. آمپول رمدسیویر روزانه به مدت ۵ روز تزریق می‌شود، در بیمارانی که روند بهبودی در آنها مشاهده نمی‌شود و نیاز به حمایت تنفسی (اکسیژن درمانی) دارند، باید بستری بوده و ممکن است درمان ادامه یابد. اگر در حین بستری شدن علائم بهبودی مشاهده شود با نظر پزشک، درمان بیمار با داروی رمدسیویر به صورت سرپایی ادامه خواهد یافت.

مددجویان عزیز! از تزریق خودسرانه داروی رمدسیویر خودداری نموده و از اصرار به پزشک درمانگر جهت دریافت آن خودداری فرمایید. این دارو حتما توسط کادر درمانی از طریق تزریق داخل رگ (وریدی) انجام می‌گردد.

### قبل از تزریق سرپایی داروی رمدسیویر چه آمادگی هایی لازم است ؟

- کادر درمان، هنگام تعویض تعداد تزریق، ساعت و مکان مراجعه برای انجام آزمایشات ضروری و تزریق سرم های آمپول رمدسیویر را طبق نظر پزشک معالج، به شما متذکر خواهند شد.
- برای انجام آزمایش های ضروری و بررسی کارکرد کبد و کلیه که شامل: آزمایش قند خون، آزمایشات کبدی-کلیوی و انعقادی می باشد، از شب قبل ناشتا باشید.
- در ساعت مقرر، با نسخه پزشک و لیست آزمایش‌ها در مرکز درمانی مشخص شده، حضور داشته باشید.
- پس از انجام آزمایش، جواب آن را به کادر درمان تحویل دهید.
- کادر درمانی آمپول رمدسیویر رقیق شده را به ۱۰۰ سی سی یا ۲۵۰ سی سی از سرم نرمال سالین ۰/۰۹٪ اضافه و به آرامی در مدت زمان ۰/۵ تا ۲ ساعت تزریق می نمایند.



### آیا نشانه های عوارض تزریق آمپول رمدسیویر را می دانید؟

- تعریق، افت فشار خون، لرز، تهوع و استفراغ از عوارض تزریق داروی رمدسیویر می باشد، در صورت مشاهده هر یک از علائم به پزشک معالج یا پرستار اطلاع دهید.

### برای کاهش عوارض داروی رمدسیویر چه اقداماتی موثر است؟

- حین و بعد از تزریق دارو آرامش داشته باشید و حتی الامکان مضطرب نشوید.
- سعی کنید پس از تزریق داروی رمدسیویر استراحت کافی داشته باشید.
- تا زمانی که حالت تهوع و استفراغ دارید از خوردن و آشامیدن هرگونه مواد غذایی یا نوشیدنی پرهیز نمایید.
- پس از رفع حالت تهوع می‌توانید از مایعات مانند آب مرغ یا گوشت... استفاده کنید.

ادامه توضیحات



## آنچه که باید درباره ی ((داروی رمدسیویر)) بدانید

### سایر نکات مهم:

- در طول دریافت رمدسیویر رعایت نکات قرنطینه در منزل لازم می باشد.
- حتماً هنگام تردد ماسک بزنید.
- حتماً فاصله ۱,۵ متری را از سایر افراد رعایت نمایید.
- حتماً رعایت شستن دست ها قبل و بعد از تماس با سطوح و لوازم رعایت شود.
- هنگام تردد به بیمارستان جهت تزریق دارو حتما از وسایل نقلیه شخصی یا آژانس استفاده نمایید و حتما شیشه اتوموبیل پایین باشد تا تهویه هوا انجام گردد.
- از وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس، مترو ، تاکسی دارای سرنشین دیگر استفاده نکنید.
- حتماً جهت تزریق سرپایی رمدسیویر با همراه به بیمارستان مراجعه نمایید.
- هنگام ورود به بخش سرپایی حتماً گان برای خود و همراه داشته باشید.
- حداقل ۸ لیوان مایعات در طول روز استفاده نمایید.

### زیر نظر :

سرکار خانم دکتر ام البنین پاک نژاد

فوق تخصص بیماری های ریوی

آموزش سلامت دفتر پرستاری بیمارستان شریعتی

جناب آقای دکتر کیوان گوهری مقدم

فوق تخصص بیماری های ریوی